

大腸CT-(大腸仮想内視鏡)検査を受ける方へ

殿 検査日予定 月 日() 時 分 10分前にお越しくさ

大腸の検査は、腸内が空腹(カラ)になっていなければ、正確な診断が出来ません。正確なよい診断が得られるよう下記のことを守ってください。持病のお薬を服用中の方は、検査前に医師へ申し出てください。

問診 緑内障又は眼圧が高いと言われたことがある (はい・いいえ)
前立腺肥大症である (はい・いいえ)

※当日クリニック総合窓口を受付をしたらこの紙を11番にお出しくさ

検査前々日① 日() 夕食 普段通りで大丈夫ですが以下に注意です。

繊維の多い食物
脂肪の多い食物
消化の悪い食物

避けるよう努めてください。よい検査ができるようになります。

検査前々日②就寝前 下剤を飲む **注意！夜中に何回かトイレに行くようになりますが腸の中を空っぽにするためです。**

※コップ1杯以上の水にラキシベロンを滴下してください。

1日1回は必ず出る → 15滴くらい

日常の排便状況 普通 → 半量 を入れて飲んでください。
かなり便秘 → 全量



検査前日③ 日() 朝食 袋のまま熱湯で3~5分沸騰させるか、中身を出して、電子レンジで2分温める

水分(コップ1杯以上) 多めに飲んで

食後30分以内にお飲みください。良く振って下さい！

重要！食事が出来なくても必ず飲んで下さい





検査前日④ 日() 昼食 袋のまま熱湯で3~5分沸騰させるか、中身を出して、電子レンジで2分温める

水分(コップ1杯以上) 多めに飲んで

食後30分以内にお飲みください。良く振って下さい！

重要！食事が出来なくても必ず飲んで下さい







検査前日⑤ 日() 夕食 袋のまま熱湯で3~5分沸騰させるか、中身を出して、電子レンジで2分温める

水分(コップ1杯以上) 多めに飲んで

食後30分以内にお飲みください。良く振って下さい！

重要！食事が出来なくても必ず飲んで下さい






検査前日⑥ 日() 21時頃(寝る時間により調整してもかまいません)

粉薬を水180mLに溶かして飲んでください。

※お水の量は大体でかまいません 水180mlくらい




検査当日⑦ 日() 朝食 ご自宅にある物で水分のみ

お腹がすいた場合、砂糖湯やポカリスウェツ 飴などを検査までに少量飲んでも大丈夫です。






検査の方法 今回の検査は大腸CT検査です。

検査はお尻にチューブを入れ、お腹の痛みの少ない炭酸ガスを約2L挿入します。ある程度お腹が張ってきたら撮影を開始します。仰向け、右向き、左向きの3回撮影しますが腸の膨らみや便が残っていた場合追加撮影する場合があります。検査時間は15分ほどで終了します。結果は後日になります。検査が終われば好きなものを食べてください。

①チューブ挿入 ②炭酸ガス挿入 ③仰向け、右向け、左向け、3回撮影 終了



気を付けてください！

※空いている時間に、水分をなるべく飲んで下さい。よい検査ができるようになります。水分の代用として白湯・お茶・コーヒー(ミルクなし)でも大丈夫です。

※朝、下痢をして水のようにするのが普通です。できるだけ排便してください。

注意！前処置不良の場合、注腸X線検査(バリウム)に変更する場合があります。



検査当日、気分不快・ふらふらして力が入らないなど、即日構いませんので、来院して指示を受けてください。来院出来ない時は必ず連絡をしてください。※血圧・心臓の薬はいつも通り服用してください。